

## مناخ محافظة ديالى دراسة تحليلية لمحطتي خانقين والخالص

### Climate of Diyala Govrnorate analylitical for AL khalse and khankhen station

Instrutor. Azhar S. Hadi PH.D

م.د أزهار سلمان هادي

Diyala university

جامعة ديالى

Spatial Research Unit

وحدة الأبحاث المكانية

الكلمة المفتاح/ مناخ ديالى

Email/ [baquba\\_١٩٧٣@yahoo.com](mailto:baquba_١٩٧٣@yahoo.com)

### ملخص

تختلف محافظة ديالى عن محافظات العراق الأخرى في كونها تقع ضمن اقليمين مختلفين فجزئها الشمالي الشرقي يقع ضمن الاقليم شبه الجبلي والجزء الجنوبي والجنوبي الغربي يقع ضمن اقليم السهل الرسوبي، لذا فهي لديها خصائص مناخية تجمع بين خصائص الاقليمين الجاف وشبه الجاف. من هذا هدف البحث لتعرف على الخصائص المناخية للمحافظة من حيث معدلات درجات الحرارة الصغرى والعظمى وكمية الامطار السنوية والرطوبة النسبية، ونوع الرياح من حيث الاتجاه والسرعة، وما هي أهم الاقاليم المناخية الممثلة في المحافظة؟ وذلك من خلال تحليل الخصائص المناخية لمحطتي الخالص وخانقين خلال المدة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٠. وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: اختلاف المعدل العام لدرجة الحرارة بين المحطتين فكان (٢٣,٠ و ٢٢,٠) م°، في محطتي الخالص وخانقين على التوالي، كما ان اختلاف التضاريس ما بين شمال وجنوب المحافظة له الاثر الكبير في استلام محطة خانقين كمية امطار تقترب من الضعف مما تستلمه

محطة الخالص. ان الرياح الشمالية الغربية والشمالية سجلت اعلى نسبة تكرار وهي (٤٥,١٪) من مجموع الرياح السائدة، وبنسبة تكرار للرياح الشمالية الغربية اكثر من الشمالية. وجاءت الرياح الجنوبية الغربية والغربية ثانياً نسبة تكرار (٣٣,٣٪)، بنسبة اعلى للغربية من الجنوبية الغربية وكانت الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية هي الاكثر تكراراً في محطة خانقين بينما كانت الرياح الشمالية والشمالية الغربية هي الاكثر تكراراً في محطة الخالص. اما الرطوبة النسبية فكان لاختلاف معدلات الحرارة وطبيعة السطح للمحطتين أثرها في تباين معدل الرطوبة النسبية. ونتيجة لاختلاف الخصائص المناخية ظهر في المحافظة عند تصنيفها الى اقاليم مناخية باعتماد تصنيف كوبن ثلاثة اقاليم هي الجاف في جنوب ووسط المحافظة إذ شغل أكثر من ثلاثة أرباع مساحة المحافظة بنسبة (٨٧,٧٣٪)، وشبه الجاف بنسبة (٦١,٣٪)، وشكل الاقليم الرطب بنسبة (٣,٥٪) فقط إذ يقع في أقصى شمال المحافظة.

مقدمة

ان معرفة الخصائص المناخية ضرورة في دراسة اي اقليم، وذلك لالرتباط الواضح بين هذه الخصائص وبين النشاط الزراعي الذي يعد النشاط الاقتصادي الرئيس فيه. فضلاً عن ان الدراسات المناخية اصبحت الاساس في كثير من الدراسات ذات العلاقة الكبيرة بحياة الانسان ولها اثر واضح على عناصر البيئة الاخرى بما يعانيه العالم اليوم من تغيرات كبيرة في المناخ من ارتفاع في درجات الحرارة وقلة الامطار واثر ذلك على توفر الغذاء لسكان الارض وظهور المجاعات لذا فان التخطيط الاقتصادي ينبغي ان يضع في الاعتبار الظروف المناخية السائدة وتقلباتها المحتملة ومدى ملاءمتها للنشاط البشري، اذ يبلغ الانتاج البشري اقصاه حيث تتواءن الطاقة الحرارية داخل الجسم مع الجو المحيط به وهي الحالة التي يشعر بها الانسان بالراحة فيزياويا وذلك عندما تتوفر ظروف جوية معينة عند مديات محددة لدرجات الحرارة والرطوبة وسرعة الريح<sup>(١)</sup>.

١ - مشكلة البحث:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت مناخ العراق بجوانبه المختلفة وكانت محطة خانقين وهي احدى المحطات المناخية الرئيسية تمثل الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة، الا انه ليس هناك دراسات اهتمت بمناخ المحافظة والتعرف على الخصائص المناخية المحلية التي تتميز بها ولا سيما وجود محطة مناخية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة. لذا انطلقت مشكلة البحث من التساؤلات:

- هل موقع المحافظة بين الاقليم شبه الجبلي من جهة واقليم السهل الرسوبي من جهة اخرى ادى الى ظهور اكثر من اقليم مناخي في المحافظة؟
- هل ادى ذلك الموقع الى امتياز المحافظة بخصائص مناخية تميزها عن غيرها من محافظات العراق؟

**٢- هدف البحث:**

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الخصائص المناخية لمحافظة من حيث معدلات درجات الحرارة الصغرى والعظمى وكمية الامطار السنوية المستلمة والرطوبة النسبية، ونوع الرياح من حيث الاتجاه والسرعة، وما هي أهم الاقاليم المناخية الممثلة في المحافظة.

**٣ - فرضية البحث:**

ان موقع محافظة ديالى في الجزء الشمالي الشرقي من العراق قد اعطتها خصوصية في كون الجزء الشمالي منها يقع ضمن الاقليم شبه الجبلي بينما الجزء الجنوبي يقع ضمن اقليم السهل الرسوبي، ولكل الاقليمين خصائص مناخية تميزه عن الآخر، وهذا أكسب المحافظة خصائص مناخية مختلفة بين جزئيها الشمالي والجنوبي.

**٤ - حدود منطقة البحث:**

تتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بالحدود الادارية لمحافظة ديالى الواقعة بين خطي طول ( $40^{\circ}, 41^{\circ}$  و  $45^{\circ}, 46^{\circ}$ ) شرقاً ودائرة عرض ( $30^{\circ}, 31^{\circ}$  و  $35^{\circ}, 36^{\circ}$ ) شمالاً ، إذ يقع ضمن هذه الحدود محطتان مناخيتان تمثلان تلك المنطقة وهي محطة خانقين في شمال شرق المحافظة والخلص في جنوب غرب المحافظة، كما في خريطة (١)، بينما تمثل الحدود الزمانية ببيانات المناخية خلال المدة من ١٩٩٠ الى ٢٠٠٩ ، والسبب في اختيار هذه المدة هو توافر البيانات في كلتا المحطتين، فمحطة خانقين من المحطات المناخية القديمة إذ يعود تاريخ بياناتها الى عام ١٩٣٧ بينما محطة الخالص هي محطة حديثة نسبياً مقارنة بال الاولى إذ يعود تاريخ بياناتها الى عام ١٩٦٣ بالنسبة لقياس كمية الامطار أما الحرارة والعناصر المناخية الأخرى فلم يبدأ التسجيل إلا في عام ١٩٩١ .

## خريطة (١) حدود منطقة الدراسة وموقع المحطات المناخية المعتمدة



المصدر/ الهيئة العامة للمساحة خريطة محافظة ديالى، ١٩٩٠، بمقاييس ١:٥٠٠٠٠

### أولاً- اهم الضوابط المسيطرة على مناخ الاقاليم

ان اقليم الدراسة يمثل جزءاً من مساحة العراق، ومن الصعوبة ان تحدد ضوابط مناخية خاصة به بمعزل عن بقية أجزائه الا ان هناك بعض المؤثرات المحلية الخاصة التي يكون لها اثر في حدوث بعض الفروقات الحرارية ما بين اقليم نفسه وبينه وبين اجزاء البلد الاخرى ومن اهم الضوابط المناخية المؤثرة على العراق بشكل عام والتي يشترك اقليم الدراسة في خصوشه لها هي: الموقع الفلكي ان وقوع العراق الى الشمال من مدار السرطان يؤثر على مقدار المكتسب من الاشعاع الشمسي العمودي، وقد خلق هذا الموضع اختلافات في عدد ساعات شروق الشمس بين تموز وكانون الثاني، اذ تبلغ عدد ساعات شروق الشمس اليومية في تموز اربع عشرة ساعة واربع دقائق، بينما تقل عدد ساعات الشروق الى عشر ساعات وست عشرة دقيقة في شهر كانون الثاني،<sup>(٢)</sup> الامر الذي يجعل الصيف اكثر حرارة من

الشتاء ومما يساعد على زيادة هذه الفجوة هو خلو السماء في الصيف من السحب وقلة الرطوبة مما هو عليه في فصل الشتاء

اما التأثيرات البحرية فهي محدودة اذ يقتصر تأثير البحر المتوسط على اشهر الشتاء، وللخليج العربي تأثير محدود ضمن المنطقة الوسطى الجنوبيّة كما ان تأثيره سيئ في فصل الصيف وذلك بسبب مرافنته للمنخفض الموسمي وما يرافقه من كتل هوائية حارة ورطبة<sup>(٣)</sup>.

وفيما يخص مظاهر السطح فان معظم المحافظة جزء من السهل الرسوبي اذ يغلب على سطحها الانبساط، باستثناء الاجزاء الشمالية الشرقية منها التي تمتاز بتضرسها اذ انها تمثل الحدود الجنوبية للإقليم شبه الجبلي وهذا خلق تباينات مناخية بين الاجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية من الاقليم ولا سيما في كمية التساقط. ومن هذا نجد ان الحالة النهائية لمناخ الاقليم هو حصيلة ضوابط طبيعية عده منها الموقع الجغرافي والفلكي، وطبيعة السطح، الا انه يبقى الضابط المتمثل بموقع الاقليم بالنسبة لدوائر العرض اهمية كبيرة اذ يمتلك الاولوية بين تلك الضوابط، اذ انه يحدد زاوية سقوط الاشعاع الشمسي المسؤول عن قيمة الحرارة الواردة الى سطح الارض كما انه يحدد طول ساعات النهار المسؤولة عن كمية المكتسب من الاشعاع<sup>(٤)</sup>.

**ثانياً - وفيما يلي عرض لأهم العناصر المناخية المكونة للاقليم**

### **١- الحرارة**

ان الحالة الحرارية للاقليم يحددها بصورة رئيسة الموقع الفلكي للاقليم الذي ادى الى تحديد زاوية سقوط الاشعاع الشمسي، ومن ثم كمية الحرارة الواردة الى سطح الارض بحسب تلك الزاوية وما يصاحبها من اكتساب او فقدان على وفق ساعات الليل والنهار التي يحددها الموقع الفلكي ايضاً. كما ان للموقع الجغرافي للاقليم وطبيعة السطح دورهما في التأثير على المسار العام للحرارة في الاقليم ويمكن ان يظهر تأثير هذه الضوابط على درجات الحرارة من خلال دراسة السير السنوي لمعدل

الحرارة العام ومعدل درجة الحرارة الصغرى والعظمى خلال فصول السنة الاربعة الحارة الطويلة والباردة القصيرة وما يتخللها من فصلين انتقاليين وكما يلي:

#### أ- المعدل العام لدرجة الحرارة

يُلاحظ من خريطة (٢) ان اغلب مساحة المحافظة محصورة بين خطى حرارة ( $22,0^{\circ}\text{م}$  و  $23,0^{\circ}\text{م}$ ) وذلك على اساس حساب المعدل العام خلال مدة الدراسة وكلتا المحطتين. الا ان هذا المعدل يختلف من شهر إلى آخر، إذ يبدأ التاريخ الفعلي لفصل البارد - فصل الشتاء - في كانون الاول لأن الشمس تكون في طريقها الى مدار الجدي لتعامد عليه في الحادي والعشرين من هذا الشهر ومن خلاله ينخفض مقدار زاوية سقوط الاشعاع الشمسي الى ادنى معدل لها في الاقليم ويكون معدل عدد ساعات السطوع الشمسي الفعلي ( $5,5$ ) ساعة في الخالص و( $5,2$ ) ساعة في خانقين ونتيجة لهذين العاملين فان كمية الحرارة المكتسبة تكون قليلة، سرعان ما تفقد ارض الاقليم خلال الساعات الاولى من الليلي الطويلة في هذا الشهر، ويزيد من ذلك صفاء السماء مما يؤدي الى حدوث عجز حراري في الاقليم، الا ان هذا الشهر لا يُعد ابرد الشهور في الاقليم، اذ يكون المعدل في هذا الشهر بين ( $11,9^{\circ}\text{م}$ ) في خانقين و( $10,9^{\circ}\text{م}$ ) في الخالص، في حين يصبح المعدل في كانون الثاني بين ( $9,9^{\circ}\text{م}$ ) في خانقين و( $9,3^{\circ}\text{م}$ ) في الخالص، وذلك لسيطرة المرتفع السيبيري على المنطقة وما يرافقه من كتلة هوائية باردة، وترتفع في شهر شباط آخر أشهر الشتاء لتكون ( $12,0$  و  $11,4^{\circ}\text{م}$ ) في كلتا المحطتين على التوالي، كما يلاحظ من شكل (١). ورغم الاستقرار في سيادة الحرارة المنخفضة الا ان هذا الفصل يُعد من اكثر الفصول تقلباً بسبب تعرض الاقليم للمنخفضات الجوية والكتل الهوائية القطبية القارية (CP) في بداية هذا الفصل.

تبداً درجات الحرارة بالارتفاع في بداية شهر اذار وهو بداية فصل الربيع فبلغت ( $15,7$  و  $16,0^{\circ}\text{م}$ ) في محطتي الخالص وخانقين، و ( $27,6$  و  $29,0^{\circ}\text{م}$ ) على التوالي في مايس، ويُعد شهر حزيران بداية شهر الصيف فترتفع درجة الحرارة الى ما فوق ( $30^{\circ}\text{م}$ ) إذ يبلغ المعدل في محطة خانقين ( $34^{\circ}\text{م}$ ) والخالص ( $31,7^{\circ}\text{م}$ ) وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع ويُعد شهر تموز الاكثر حرارة إذ بلغ المعدل السنوي


(٣٦,٤°) في خانقين و(٤٣°) في الحالص وذلك بسبب زيادة عدد ساعات سطوع الشمس إذ تبلغ إلى أقصى مدى لها وهو عشر ساعات وستون دقيقة في محطة خانقين واحدى عشرة ساعة وسبعون دقيقة في محطة الحالص، كما ان سيطرة منظومة الضغط المنخفض الهندي وسيادة الكتلة المدارية الحارة اثرها في رفع معدل درجة الحرارة.

وفي شهر ايلول اول اشهر الخريف لايزال معدل درجة الحرارة مرتفعاً إذ بلغ (٣١°) في خانقين و(٢٩°) في محطة الحالص وذلك بسبب زيادة كمية المكتسب من الاشعاع الشمسي والفائض الحراري. بينما ينخفض المعدل ليصل إلى (١٧,٠ و ١٥,٦) م° في تشرين الثاني وفي كلتا المحطتين على التوالي.

اما المدى الحراري السنوي - الفرق بين معدل حرارة أعلى شهور السنة حرارة وهو شهر تموز واقلها حرارة وهو شهر كانون الثاني كما هو موضح في شكل (١) فقد وصل بين (٢٤,٧°) في الحالص و(٢٦,٥°) في خانقين، ويعود سبب كبير المدى الحراري إلى الارتفاع الكبير في درجة حرارة شهر تموز وانخفاضها في شهر كانون الثاني وسيادة المؤثرات القارية وتأثير الأقليم بالكتل الهوائية ذات درجات الحرارة المختلفة.

## خريطة (٢)


خطوط تساوي الحرارة خلال المدة (١٩٩٠/٢٠٠٩)



المصدر/ الباحثة بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة لأنواع الجووية والرصد  
الزلزالي / قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

## شكل (١)

معدلات درجات الحرارة الشهرية



المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة لأنواع الجووية  
والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

### بـ- معدل درجة الحرارة الصغرى والعظمى


تُعد درجتا الحرارة الصغرى والعظمى مؤشراً لانخفاض الحرارة وارتفاعها كما تكتسب هاتان الدرجتان أهمية لكونهما يشيران إلى حالة التوازن بين درجة الحرارة المكتسبة وكمية الحرارة المفقودة ولإعطاء صورة أفضل عن الوضع الحراري من اعتماد المعدلات السنوية.

#### - معدلات درجات الحرارة الصغرى

بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصغرى بين (١٤,٣ و ١٦,٢) م° في كل من محطتي الخالص وخانقين على التوالي ومن ملاحظة شكل (٢) نجد التدرج الحراري في معدلات الحرارة الصغرى بين كانون الثاني وتموز ويُعد معدل شهر كانون الثاني أوّل المعدلات إذ بلغ بين (٥٥) في خانقين و(٤٤) في الخالص، أما في تموز فقد ارتفع المعدل بفعل التراكم الحراري في هذا الشهر فتراوح ما بين (٢٧,٤) في خانقين و(٢٤,٥) في الخالص.

اما في الفصلين الانتقاليين فيلاحظ ان درجة الحرارة الصغرى في أيلول أكثر من ضعف معدلها في اذار إذ بلغ المعدل في الاول ما بين (٩,٦ و ٩,٠) م° في خانقين والخالص على التوالي بينما تراوح المعدل في ايلول ما بين (١٩,٥ و ٢٢,٤) في المحطتين بسبب الفرق في كمية المكتسبة من الاشعاع الشمسي والفائض الحراري .

شكل (٢) معدلات درجات الحرارة الشهرية الصغرى



المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/  
قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

## - درجة الحرارة العظمى


بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة العظمى ( $30,0$  و  $31,0$ ) م° في كل من محطتي الخالص وخانقين ويُعد معدلاً مرتفعاً، ويعود سبب ذلك إلى اتساع زاوية سقوط الإشعاع الشمسي وطول النهار. ففي شهر كانون الثاني الذي يُعد من أبرد الشهور بلغ المعدل ( $15,4$  و  $15,2$  م°). أما في تموز فقد بلغ المعدل ( $43,1$  و  $44,9$ ) م°.

وفي فصل الاعتدال فإن الفرق واضح في معدلات درجات الحرارة العظمى بين أشهر هذين الفصلين، ففي الربع بلغ مقدار الفرق ( $13$  م°) بين شهر اذار الذي بلغ المعدل فيه ( $22,9$  و  $23,2$ ) م° في خانقين والخالص وفي شهر مايس الذي كان المعدل ( $36,9$  و  $35,6$ ) م°، وقد ازداد الفرق في معدل درجة الحرارة العظمى بين شهر الخريف اذ بلغ الفرق بين ايلول وتشرين الثاني ( $16$  م°) اذ كان المعدل في ايلول ( $40,6$  و  $38,8$ ) م° وتشرين الثاني ( $24,3$  و  $23,3$ ) م° في كل من محطتي خانقين والخالص على التوالي كما مبين في شكل (٣).

ومن ذلك يتضح ان معدلات درجات الحرارة في محطة خانقين هي اكثر من معدلها في محطة الخالص سواء اكانت العظمى أم الصغرى وذلك يعود الى ان موقع خانقين حوضي تحيط به المرتفعات مما يؤثر في احداث تعديل في معدل درجة حرارة الهواء الذي ينساب من تلك السفوح او ما يُعرف بظاهرة الفوهن إذ ان انحدار الرياح على سفوح تلك المرتفعات يرفع من معدلات درجات حرارتها، بينما يكون موقع محطة الخالص ضمن منطقة سهلية مفتوحة فلا يحدث تعديل في معدل درجة حرارة الرياح التي تستقبلها تلك المحطة.

## شكل (٣)

## معدل درجات الحرارة الشهرية العظمى



المصدر / بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواع الجوية  
والرصد الزلزالي / قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

١- الامطار

تعد الامطار الساقطة على العراق ومن ضمنها اقاليم الدراسة نظام البحر المتوسط و تعد المنخفضات الجوية القادمة من البحر المذكور هي السبب الرئيس للتساقط في العراق<sup>(٥)</sup>، ولكن ليس منخفضات البحر المتوسط هي العامل الوحيد لتحديد كمية التساقط، وإنما يعد الارتفاع هو العامل الاساسي لذلك تزداد كمية الامطار السنوية في المناطق الجبلية لأنها تضطر الرياح الرطبة الى الصعود فتقل درجة حرارتها وتتكاثف رطوبتها فتنزل مطرًا<sup>(٦)</sup>.


بلغ المعدل السنوي للامطار المتساقطة خلال مدة الدراسة (٢٦٧,٩) ملم في محطة خانقين و (١٤٤,٠) ملم في محطة الخالص، وهذا يتفق مع طبيعة توزيع امطار العراق اذ انها تزداد بالاتجاه من الجنوب الغربي الى الشمالي الشرقي لكونها مناطق مرتفعة. وبذلك يُلاحظ من خريطة (٣) ان خط المطر المتوازي (١٥٠) ملم يمر فوق محطة الخالص بينما تقع محطة خانقين بين خطي المطر (٢٥٠ و ٣٠٠) ملم.

اما فيما يخص توزيع هذه الكمية بين فصول السنة فنجد ان نصف هذه الكمية تسقط في فصل الشتاء والنصف الآخر مقسوم ما بين الخريف والربيع وتبين واضح بين المحيطتين إذ بلغ معدل الامطار الساقطة في محطة خانقين في فصل الشتاء (٤٨,٨) ملم بينما كان المعدل في محطة الخالص (٢٦,٨) ملم، اما في فصل الخريف والربيع فقد كان المعدل (٢٥,٦ و ٢٥,٥) ملم على التوالي في محطة خانقين و(١٣,٢ و ١٣,٥) ملم على التوالي في محطة الخالص كما مبين في شكل (٤).


ومثلا هناك تباين في كمية التساقط بين فصل واخر من فصول السنة يوجد تباين في كمية التساقط بين شهر واخر، ففي أشهر الخريف نجد ان اقل معدل سجل في تشرين الاول (١٢,٦ و ٩,١) ملم في محطة خانقين والخالص على التوالي والذي يمثل بداية موسم سقوط الأمطار إذ تسجل المنخفضات الجبهوية أدنى تكرار لها في هذا الفصل.

## خريطة (٣)

خطوط تساوي المطر في المحافظة خلال المدة (١٩٩١ إلى ٢٠٠٩)



المصدر/ الباحثة بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة)  
شكل (٤) معدل كمية الأمطار الفصلي




المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

اما في اشهر الشتاء (كانون الاول و كانون الثاني و شباط) فتصل الامطار الى قمتها بسبب زيادة عدد المنخفضات الجوية فضلاً عن زيادة عمقها التي يسببها زيادة الفارق الحراري بين الكتلتين الهوائيتين القطبية (CP) والمدارية القارية (CT). وتتفاوت اشهر الشتاء فيما بينها في معدلات التساقط إذ ان اعلى معدل سجل في شهر كانون الثاني وصل الى (٦٦,٠) ملم محطة خانقين و (٣٤,٦) ملم في محطة الخالص.

اما في شهر اذار الذي يمثل بداية اشهر الربيع فقد بلغ معدل الامطار الساقطة (٤٣,٥ و ١٧,٩) ملم في خانقين والخالص، وفي شهر مايس الذي يمثل نهاية موسم التساقط ينخفض معدل الامطار الى ادنى معدل له ليصل الى (٤,٥) ملم في خانقين و (١,٩) ملم في الخالص بنسبة (١٥٪، ١٥٪) من المجموع وذلك لأن تأثير المنخفضات المتوسطية يبدأ بالانحسار خلال هذا الشهر.

ومن هذا يتضح ان اعلى كمية تساقط في الاقليم هو في شهر كانون الثاني واذار أما أقل كمية تساقط فكانت في شهري تشرين الاول الذي يمثل بداية موسم التساقط ومايس الذي يمثل نهاية موسم التساقط ويتباين واضح ما بين المحطتين يصل الى النصف تقريباً، وهذا يتفق مع طبيعة مرور منخفضات البحر المتوسط التي تبدأ من منتصف تشرين الاول وتكون اعلى قمة في تكرارها ما بين كانون الثاني واذار ثم تصل الى ادنى معدل لتكرارها في شهر مايس.

### شكل (٥) معدل الامطار الشهري



المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

## ٢- الرياح

### أ- الاتجاهات الرئيسية لهبوب الرياح في الأقليم:

ليس هناك درجة ثبات واضحة للرياح فهي متغيرة بشكل مستمر، ان عدم ثبات اتجاه الرياح يعني عدم سيادة رياح معينة على مدار السنة، وذلك بسبب خضوع العراق بشكل عام ومن ضمنها اقليم الدراسة الى تأثير اختلاف توزيع اقام الضغط الجوي في المناطق المحيطة به والمؤثرة فيه وان اي تغير يحصل في تلك الاقام يؤثر في حركة الرياح في الأقليم.

يتأثر الأقليم بأنواع مختلفة من الرياح تأتي اليه من الاتجاهات الثمانية وعند النظر الى الجدوليين (١و ٢) نخرج بالنتائج الآتية :

**١- الرياح الشمالية الشرقية والشرقية:** تشكل نسبة (%) ٧٩ من مجموع الرياح الهابهة على الأقليم (%) ٢٥ منها رياح شمالية شرقية و (%) ٥٤ شرقية. وسجلت محطة خانقين أعلى نسبة تكرار لهذه الرياح في جميع شهور السنة ماعدا شهر تموز، وسجل شهر شباط أعلى النسب إذ كانت (%) ١٩،٤، أما محطة الخالص فان تكرار هذا النوع كان ضعيفاً جداً ولم يسجل نسبة تكرار سوى في شهرين فقط هما شباط ومايس.

**٢- الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية:** تشكل نسبة (%) ١٣،٨ من مجموع الرياح الهابهة على الأقليم (%) ٦،٦ منها جنوبية شرقية و (%) ٧،٢ منها جنوبية. يبدا ظهور هذا النوع من الرياح بين شهر تشرين الاول ونisan في محطة الخالص، وبين شهري تشرين الثاني ومايس في محطة خانقين، وسجلت محطة الخالص أعلى نسبة تكرار إذ بلغت (%) ١٠،٥ ، وبعده شهر كانون الثاني اكثر تكراراً لها إذ سجل نسبة (%) ١٩،٠ من مجموع التكرار السنوي لها بينما بلغت أقل نسبة في شهر تشرين الاول وبنسبة (%) ٢،١، بينما بلغت نسبة التكرار (%) ٣،٣ في محطة خانقين وسجل فيها شهر شباط أعلى تكرار وبنسبة (%) ٧،٩ من مجموع التكرار السنوي لها بينما بلغت اقل نسبة تكرار (%) ١،٦ في شهر تشرين الثاني وكانون الاول ونisan ومايس.

**٣- الرياح الجنوبية الغربية والغربية:** وتشكل نسبة تكرار يقدر بـ(٣٣,٣٪) من مجموع الرياح الهابطة، (١,٨٪) منها جنوبية غربية و(٣١,٥٪) غربية، يظهر هذا النوع من الرياح في جميع شهور السنة وهو أكثر تكراراً في محطة خانقين إذ تشكل نسبة (٢٣,٢٪)، وسجلت المحطة أعلى تكرار شهري مابين شهري تموز وأيلول بنسبة تراوحت بين (٩,٢٪ و ٩,٧٪) على التوالي. بينما شكلت هذه الرياح نسبة (١٠,١٪) في محطة الخالص وكان أعلى تكرار في شهر حزيران بنسبة تراوحت (٦,٦٪) من مجموعها السنوي.

### جدول (١)

#### أهم أنواع الرياح المؤثرة على منطقة الدراسة ونسبة التكرار السنوي

المحطة	خانقين	الخالص	نسبة تكرار الرياح في الأقليم	النسبة من المجموع الكلي	
شمالية	شمالية غربية	غربية	جنوبية غربية	جنوبية شرقية	شمالية شرقية
٠,٢	١٢,٣	٢١,٤	١,٨	١,١	٢,٢
٧	٢٥,٥	١٠,١		٦,١	٤,٤
٧,٢	٣٧,٨	٣١,٥	١,٨	٧,٢	٦,٦
	٤٥,٠		٣٣,٣	١٣,٨	٧,٩

المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي/

قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

## جدول (٢)

## نسبة التكرار الشهري للرياح من مجموع تكرارها

الشهر	شمالية شرقية وشرقية	جنوبية شرقية وجنوبية	جنوبية غربية وغربية	شمالية غربية وشمالية
الخاص	حانفين	الخاص	حانفين	الخاص
تشرين اول	٢,٨	٠,٠	٦,٦	٢,٠
تشرين ثاني	٢,٨	٩,٥	٦,٦	٠,٧
كانون اول	١٦,٧	١,٦	٥,٣	٠,٠
كانون ثاني	١٣,٩	٦,٣	٣,٣	٠,٧
شباط	١٩,٤	٧,٩	٥,٣	١,٠
اذار	١١,١	٣,٢	١٤,٣	٠,٠
نيسان	١١,١	١,٦	٣,٢	٢,٦
مايس	٥,٦	١,٦	٥,٣	٣,٩
حزيران	٢,٨	٠,٠	٥,٩	٦,٦
تموز	٠,٠	٠,٠	٧,٩	٤,٦
آب	٢,٨	٠,٠	٧,٩	٤,٦
ايلول	٢,٨	٠,٠	٧,٢	٣,٩
النسبة المئوية لكل محطة	٧,٢	٣,٣	١٠,٥	١٠,١
المجموع الكلي	٧,٩	١٣,٨	٣٣,٣	٤٥,٠

المصدر / بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

٤ - الرياح الشمالية الغربية والشمالية: وهذا النوع أكثر تكراراً في الأقليم اذ سجل نسبة (٤٥,١٪) من مجموع تكرار الرياح في الأقليم (٣٧,٩٪) منها رياح شمالية غربية و (٧,٢٪) رياح شمالية، وهذا النوع أكثر تكراراً في محطة الخاص إذ إنّ نسبة تكرارها وصلت الى (٣٢,٦٪) بينما كانت نسبة تكرارها في محطة خانفين (١٢,٥٪) وتميز هذه الرياح باستمرار هبوبها خلال شهور السنة حتى ان نسب تكرارها الشهري تكاد تكون متقاربة في معظم أشهر السنة.

## ب- سرعة الرياح

يتميز الأقليم بأنه لا يُعد من المناطق التي تكون رياحها ذات سرعة عالية، وذلك لأن العراق عموماً يتصرف بسرعة منخفضة على مدار السنة نظراً لوقوعه في الحزام شبه المداري الواقع تحت تأثيرات منظومات الضغط العالي شتاءً والمنخفض الحراري صيفاً وهاتان المنظومتان لا تساعدان على هبوب رياح نشطة أو قوية باستثناء الحالات الجوية التي تحدث فيها اضطرابات ودومات ضغطية وبالخصوص الدومات القطبية ودومات البحر المتوسط التي تؤثر في فصلي الشتاء والربيع والتي تصاحبها عادة رياح عالية السرعة كذلك حالات الرياح النشطة التي تصاحب الاحداث الضغطية التي تنشأ في جميع فصول السنة ولا سيما في فصل الربيع الذي تصل فيه سرعة الرياح المديات الاعصرية<sup>(٧)</sup>.

يتضح من الجدول (٣) ان متوسط سرعة الرياح يكون منخفضاً في الأقليم اذ يبلغ المعدل السنوي في محطة الخالص (٢,٥م/ثا) بينما في خانقين (١,٥م/ثا) وسبب الاختلاف بين المحطتين يعود الى طبيعة السطح المنبسطة التي تمتاز بها الاولى بينما الثانية هي منطقة تلال تقف عائقاً امام حركة الرياح.

كما ويلاحظ ان سرعات الرياح متباينة بين شهر وآخر إذ إن أعلى معدل سرعة لها سجل في أشهر الربيع والصيف، إذ بلغ معدل السرعة في شهر الربيع (٢,٤م/ثا) وهي أعلى من المعدل السنوي بقليل وبلغ معدل السرعة في محطة الخالص (٢,٩م/ثا) وفي خانقين (١,٩م/ثا) ويعود سبب ارتفاع معدلات السرعة في هذا الفصل الى زيادة نشاط المنخفضات الجوية، اما في الفصل الحار فقد بلغ معدل سرعة الرياح في الأقليم (٢,٣م/ثا) وكان معدلها في محطة الخالص (٣,١م/ثا)، اما في خانقين فقد بلغ (١,٦م/ثا) ويعود سبب زيادة سرعة الرياح في هذا الفصل الى زيادة شدة المنخفض الضغطي نحو مركز المنخفض الهندي الموسمي .

## جدول (٣)

## السرعة المسجلة للرياح خلال اشهر السنة م/ثا

المحطة	١ ت	٢ ت	١ كانون ٢	١ كانون ١	شباط	اذار	نيسان	مايس	حزيران	تموز	آب	ايلول	المعدل السنوي
خانقين	١,٣	١,٢	١,٤	١,٠	١,٦	١,٨	١,٩	٢,٠	١,٧	١,٦	١,٤	١,٤	١,٥
الخلالص	١,٧	١,٧	٢,٢	١,٩	٢,٨	٢,٩	٣,١	٢,٧	٣,٢	٣,٣	٢,٧	٢,١	٢,٥
المعدل	١,٥	١,٥	٢,٢	١,٤	٢,٤	٢,٥	٢,٤	٢,٥	٢,٥	٢,٤	٢,١	١,٧	٢,٠

المصدر / بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي /

قسم المناخ (بيانات غير منشورة)


#### ٤ - الرطوبة النسبية :

يُلاحظ من الشكل (٦) ان المعدل السنوي للرطوبة النسبية في الاقليم تراوح ما بين (٥٥%) في الخالص و(٤٨,٦%) في خانقين وهناك تباين في مقدار الرطوبة ما بين شهر واخر إذ ان أعلى معدل للرطوبة كان في شهر كانون الثاني، إذ بلغت بين (٧٧,١%) في خانقين و(٧٨%) في الخالص. أما أقل معدل للرطوبة فقد سجل في شهر تموز إذ كان المعدل (٣٤%) في الخالص و(٢٦,٤%) في خانقين، كما ويلاحظ من الشكل (٧) ان فصل الشتاء سجل أعلى معدلات للرطوبة من باقي الفصول، وذلك لانه هناك علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والرطوبة لذا فان الرطوبة تكون أعلى في الفصل البارد عنها في الفصل الحار، إذ بلغت نسبة الرطوبة في هذا الفصل (٧٤%) وهي النسبة نفسها في كلتا المحطتين، ثم تبدأ بالانخفاض في فصل الربيع بفارق (٢٠%) عن الشتاء إذ بلغت (٤٩%) في خانقين و(٥١%) في الخالص، اما في فصل الصيف فقد سُجلت ادنى معدلات للرطوبة إذ بلغت (٣٤,٣%) في الخالص و(٢٧,١%) في خانقين. ثم تبدأ بالارتفاع قليلاً في فصل الخريف بزيادة قدرها (١٥%) تقريرياً عن فصل الصيف وكانت النسبة في خانقين (٤٣,٩%) وفي الخالص (٥٢%). يتضح مما سبق ان محطة الخالص سجلت معدلات للرطوبة النسبية أعلى مما في محطة خانقين ويعود ذلك الى الفارق في معدلات درجات الحرارة إذ ان الاولى سجلت معدلات لدرجات الحرارة العظمى

والصغرى أقل من الثانية، إذ ان العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية علاقة عكسية، كما أن طبيعة السطح أثراً في زيادة كمية الرطوبة فمحطة خانقين ضمن منطقة تلال تخلو من الغطاء النباتي، بينما محطة الخالص ضمن منطقة اغلب اراضيها زراعية مما لها دور في زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

شكل (٦)


## الرطوبة النسبية المسجلة خلال الشهر



المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة لأنواع الجوية والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

شكل (٧)

## الرطوبة النسبية المسجلة خلال فصول السنة




المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة لأنواع الجوية والرصد الزلزالي/ قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

### ثالثاً - الأقاليم المناخية في المحافظة

من خلال حساب معدلات درجات الحرارة والأمطار خلال مدة الدراسة يمكن ان نميز ثلاثة اقاليم مناخية في المحافظة بالاعتماد على تصنيف كوبن، هي الجاف في جنوب ووسط المحافظة إذ شغل اكثر من ثلاثة ارباع مساحة المحافظة بنسبة (٧٣,٨٧٪)، وشبه الجاف بنسبة (٢٢,٧٣٪)، وشكل الاقليم الرطب نسبة (٥٣,٥٦٪) فقط إذ يقع في أقصى شمال المحافظة. وبذلك يتضح ان اغلب مساحة المحافظة تقع ضمن الاقليم الجاف إذ بلغت (٤٢كم²) من مجموع مساحة المحافظة البالغ (٩٤٦١كم²)، وشكل الاقليم شبه الجافة مساحة (٤٠٢٢كم²) في حين لم يشكل الاقليم الرطب إلا مساحة قدرها (٣٠٤كم²) من المجموع .

#### (٤) الأقاليم المناخية لمحافظة ديالى خلال المدة (١٩٩١/٢٠٠٩)



المصدر/ بالاعتماد على وزارة النقل والمواصلات الهيئة العامة للانواع الجوية والرصد الزئالي/  
قسم المناخ (بيانات غير منشورة)

## الاستنتاجات

من خلال العرض السابق يُسْتَنِجُ مَا يلي:

١- ان المعدل العام لدرجة الحرارة في المحافظة تراوح بين ( $22,0$  و  $23,0$ ) م°، في محطة الخالص وخانقين على التوالي، وان سبب الاختلاف في المعدل يعود إلى موقع محطة خانقين الحوضي إذ تحيط بها المرتفعات، التي تؤثر في تعديل معدل درجة حرارة الهواء المناسب من تلك السفوح، بينما محطة الخالص تقع ضمن منطقة سهلة مفتوحة فلا يحدث اي تعديل في معدلات درجة حرارة الكتل الهوائية الهابهة عليها.

كما يُلاحظ ان الفرق بين المحطتين في معدل درجة الحرارة الصغرى اكثُر من الفرق في معدل درجة الحرارة العظمى فكان معدل درجة الحرارة الصغرى ( $14,3$  و  $16,2$ ) م°، بينما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى ( $30,0$  و  $31,0$ ) م° وكلتا المحطتين على التوالي.

٢- ان اختلاف التضاريس بين شمال وجنوب المحافظة له الاثر الكبير في استلام محطة خانقين كمية أمطار تقترب من الضعف مما تستلمه محطة الخالص إذ بلغ المعدل ( $267,9$  ملم) في الاولى و( $44$  ملم) في الثانية.

٣- سجلت محطة الخالص معدلات للرطوبة النسبية اعلى مما في محطة خانقين ويعود ذلك الى الفارق في معدلات درجات الحرارة إذ ان الاولى سجلت معدلات لدرجات الحرارة العظمى والصغرى اقل من الثانية، إذ ان العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية علاقة عكسية، كما ان لطبيعة السطح اثراً في زيادة كمية الرطوبة فمحطة خانقين ضمن منطقة تلال تخلو من الغطاء النباتي، بينما محطة الخالص ضمن منطقة أغلب أراضيها زراعية مما لها دور في زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

٤- على الرغم من عدم وجود درجة ثبات واضحة للرياح السائدة إذ ان المحافظة تتعرض لأنواع مختلفة من الرياح وبنسب متفاوتة الا ان الرياح الشمالية الغربية والشمالية سجلت اعلى نسبة تكرار وهي (٤٥,١٪) من مجموع الرياح السائدة، وبنسبة تكرار للرياح الشمالية الغربية اكثـر من الشمالية. وجاءت الرياح الجنوبية الغربية والغربية ثانياً نسبة تكرار (٣٣,٣٪)، بنسبة اعلى للغربية من الجنوبية الغربية.

اما بالنسبة لاكثر الرياح سيادة فيتضح ان الرياح الجنوبية الغربية والغربية هي الاكثر تكراراً في محطة خانقين إذ شكلت نسبة (٥٠,٢٪) من مجموع الرياح المتكررة على المحطة خلال مدة الدراسة. بينما كانت الرياح الشمالية والشمالية الغربية هي الاكثر تكراراً في محطة الخالص إذ شكلت نسبة (٦٠,٦٪) من مجموع الرياح السائدة في المحطة خلال مدة الدراسة، وهذا يمكن ان يكون سبباً اخر في تسجيل محطة خانقين معدل درجة حرارة اعلى من محطة الخالص فضلاً عما ذكر.

### Abstract

Diyala Governorate different from other Governorate in Iraq ,for its lies between tow region, it part north – east lies in sime mountain region, and the south and south –west lies in plans region. So its have climate attribute collected between the sime-arid and arid region. The aim of search to know attribute of climate in Diyala , in depend on Alkhals and Khanken station for duration from ١٩٩٠ to ٢٠١٠. The search get Some conclusions: Diferent the arrange of temperature between there station so it was (٢٣,٠ , ٢٠,٠) in ALkhalse and khankhen. The varies topographic between north and south study area affected on receiving amount rain between its, so khanken station receiving rain more than alkhals. About speed and direction wind, the north-west and north wind recording (٤٥,١٪) from amount general wand. Although the south and south-west was more frequently in khankhen station, where the north and north-west west was more frequently in. The relative humidity also deferent between there station. So the deferent attribute climate it effect on type of region climate that it appears when classify it in to region depending on Koppen classification ,that region is humid on the north with percentage(٣,٥٦١٪),sime-arid in the mide-north with percentage(٢٢,٧٣١٪), and arid region in the middle and south with percentage (٧٣,٨٧٠٪) .

المصادر

- حازم توفيق سلمان، العوامل والتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، الهيئة العامة للأنواء الجوية، بغداد، بدون سنة طبع ، ص ١.
- Ali H. AL-Shalash. The climte of Iraq Amman,Jorden, ١٩٦٦, P11.
- صلاح حميد الجنابي، سعدي علي غالب، جغرافية العراق الاقليمية، مطبعة جامعة الموصل ، ١٩٩٢ ، ص ٨٣-٨٦ .
- عبد الإمام نصار ديري، تحليل جغرافي لخصائص مناخ القسم الجنوبي من العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الاداب ، جامعة البصرة ، ١٩٨٨ ، ص ٣٧
- دبليو جي كندرو، مناخ القارات، ج ١، تعريب حسن طه النجم وعلي محمد المياح وحسن عليوي الخياط، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٦٧ ، ص ٣٥٧ .
- جاسم محمد الخلف، محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية، معهد الدراسات العربية العليا، ط ٢، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة ١٩٦١، ص ١٠٥ .
- أحمد سعيد حديد، وآخرون، المناخ المحلي، الموصل، مطبعة جامعة الموصل، ١٩٨٢ ، ص ١٨٤ .
- وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة لأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، (بيانات غير منشورة).